

Información sobre medicamentos para el paciente

Penicilina G Benzatínica o Penicilina G Procaína

Inyección

Este medicamento es un antibiótico y se utiliza para tratar infecciones bacterianas.

NO LO UTILICE si ha tenido una reacción alérgica a la penicilina o procaína (en inglés se escribe como penicillin or procaine). Este medicamento no es adecuado para todos.

Como utilizar este medicamento:

Una enfermera u otro proveedor de atención médica le administrará este medicamento.

Este medicamento se inyecta en uno de sus músculos. Por lo general, se administra en la parte superior de los glúteos o en la zona de la cadera.

Dosis olvidada: Este medicamento debe administrarse en un horario fijo. Si olvida una dosis, llame a su médico, a su cuidador de salud en el hogar o a la clínica de tratamiento para recibir instrucciones.

Su médico le prescribirá la dosis exacta y le indicará la frecuencia con la que se debe administrar.

Consejo: Evite las relaciones sexuales durante 7 días después de completar el tratamiento.

Medicamentos y Comida a Evitar:

Algunos medicamentos pueden afectar la eficacia de la penicilina G benzatínica/penicilina G procaína. Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los productos herbales.

Informe a su médico si está usando alguno de los siguientes:

- Acetaminofén, cloroquina, metoclopramida, primaquina, probenecid, quinina, sulfasalazina. En inglés se escribe como (acetaminophen, chloroquine, metoclopramide, primaquine, probenecid, quinine, sulfasalazine).
- Medicamentos contra el cáncer (incluyendo ciclofosfamida, flutamida, hidroxurea, ifosfamida, rasburicasa). En inglés se escribe como (cyclophosphamide, flutamide, hydroxyurea, ifosfamide, rasburicase).
- Medicamentos para adormecerlo (incluyendo articaína, benzocaína, bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, procaína, ropivacaína, tetracaína). En inglés se escribe como (articaine, benzocaine, bupivacaine, lidocaine, mepivacaine, prilocaine, procaine, ropivacaine, tetracaine).
- Medicamentos para tratar las convulsiones (incluyendo fenobarbital, valproato de sodio). En inglés se escribe como (phenobarbital, sodium valproate).
- Nitrate or nitrite medicine (incluyendo óxido nítrico, nitroglicerina, nitroprusiato, óxido nítrico). En inglés se escribe como (nitric oxide, nitroglycerin, nitroprusside, nitrous oxide).

- Otros medicamentos para tratar una infección (incluyendo dapsona, nitrofurantoina, ácido para-aminosalicílico, sulfonamida, tetraciclina). En inglés se escribe como (dapsona, nitrofurantoin, para-aminosalicylic acid, sulfonamide, tetracycline).

Posibles efectos secundarios durante el uso de este medicamento:

Llame a su médico de inmediato si nota alguno de estos efectos secundarios:

- Reacción alérgica: comezón o urticaria, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón u hormigueo en la boca o garganta, opresión en el pecho, dificultad para respirar
- Erupción en la piel con ampollas, descamación y enrojecimiento
- Cambio en la cantidad o frecuencia de orina. Orina con sangre o turbia, dificultad o dolor al orinar
- Diarrea que puede contener sangre, y dolor de estómago
- Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos, brazos, piernas o pies
- Labios, uñas o piel pálidos, grises o azules, orina oscura, dolor de cabeza, mareos, cansancio o debilidad inusual, dificultad para respirar
- Sangrado inusual, moretones o debilidad

Si nota estos efectos secundarios menos graves, hable con su médico: dolor, picazón, ardor, hinchazón o un bulto debajo de la piel donde se aplicó la inyección.

Si nota otros efectos secundarios que cree que son causados por este medicamento, informe a su médico.

Advertencias a utilizar este medicamento:

Informe a su médico si está embarazada o amamantando, si tiene enfermedad renal, problemas cardíacos, problemas pulmonares o respiratorios, un trastorno sanguíneo, deficiencia de G6PD o antecedentes de asma o alergias, incluida una reacción alérgica previa a un antibiótico de cefalosporina.

Este medicamento puede causar los problemas siguientes:

- Reacciones cutáneas graves, incluido el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, la reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) o la pustulosis exantemática aguda generalizada (AGEP)
- Problemas de la sangre, incluida la metahemoglobinemia

Este medicamento puede causar diarrea. Llame a su médico si la diarrea se vuelve severa, no se detiene o tiene sangre. No tome ningún medicamento para detener la diarrea hasta que haya hablado con su médico. La diarrea puede ocurrir 2 meses o más después de dejar de tomar este medicamento. **Llame a su médico si sus síntomas no mejoran o si empeoran.**

Mantener todas las citas. Su médico le hará pruebas de laboratorio en visitas regulares para comprobar los efectos de este medicamento.