

OUTBREAKS OF CANINE INFLUENZA H3N2 AND LEPTOSPIROSIS IN DOGS IN LOS ANGELES COUNTY

Canine Influenza H3N2 (CIV H3N2) outbreak

- From July to October 2021, there have been over 1,000 confirmed and suspected cases of CIV H3N2 reported in LA County and 5 dogs have died from the disease.
- This outbreak is spreading rapidly throughout LA County, affecting many pet boarding and daycare facilities. Some pets have also been infected at dog parks, while on walks, and other places where they come near other dogs.
- Symptoms in dogs include: cough, fever, sneezing, discharge from the nose, lethargy and loss of appetite. Signs vary from no symptoms to developing severe or fatal pneumonia.
- Dogs can get sick from direct contact with other dogs that are infected, through coughing or sneezing, or by contact with contaminated objects (clothing, shoes, food and water bowls, toys, etc.).
- Testing for the virus is available from your veterinarian.
- Dogs with CIV H3N2 can be contagious to other dogs for several weeks after recovery.



Protect your pet and help stop the spread of these diseases:

- Vaccinate dogs against both CIV H3N2 and leptospirosis, especially before entering boarding or daycare facilities or coming in contact with other dogs.
- Keep sick or infected dogs at home:
 - For CIV H3N2 – keep sick dogs home for 28 days from the first day of illness.
 - For leptospirosis – keep dogs at home until medication is finished.

For more information:

<http://publichealth.lacounty.gov/vet>



BROTES DE INFLUENZA CANINA H3N2 Y LEPTOSPIROSIS EN PERROS EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Brote de influenza canina H3N2 (CIV H3N2)

- De julio a octubre de 2021, se han notificado más de 1,000 casos confirmados y sospechosos 2 en el condado de Los Ángeles y 5 perros han muerto a causa de la enfermedad.
- Este brote se está extendiendo rápidamente por todo el condado de LA y afecta a muchas perreras privadas y guarderías de perros. Algunas perros se han infectado en parques para perros y en otros lugares donde se acercan a otros perros.
- Los síntomas en los perros incluyen: tos, fiebre, estornudos, secreción nasal, letargo y pérdida de apetito. Es posible que se produzca una neumonía grave o mortal. Algunos infectados no tienen síntomas.
- Los perros pueden infectarse por contacto directo con otros perros infectados, al toser o estornudar, o por contacto con objetos contaminados (juguetes, comederos y bebederos, zapatos, etc.).
- Su veterinario puede realizar pruebas para detectar el virus.
- Los perros con CIV H3N2 pueden contagiar a otros perros durante varias semanas después de la recuperación.



Proteja a su mascota y ayude a detener la propagación de estas enfermedades:

- Vacunar a los perros tanto contra el CIV H3N2 y Lepto, especialmente antes de entrar en una perrera o guardería o antes de entrar en contacto con otros perros.
- Mantenga a los perros enfermos o infectados en casa.
- Para CIV H3N2: mantenga a los perros enfermos en casa durante 28 días a partir del primer día de la enfermedad.
- Para Lepto: mantenga a los perros infectados en casa hasta que termine la medicación.

For more information:

<http://publichealth.lacounty.gov/vet>



11/2/2021